

Farbanomalien bei der Gelbbauchunke *Bombina variegata*
(LINNAEUS, 1758) (Anura: Discoglossidae)

Mit 1 Abbildung

Farbanomalien bei der Gattung *Bombina* scheinen recht selten zu sein, wie die nur wenigen Hinweise in der Literatur vermuten lassen. WIKTOROWA (zit. nach MERTENS 1975) fand in den polnischen Karpaten eine weiße Gelbbauchunke, MERTENS (1975) beschrieb ein „teilweise albinistisches“ Tier aus der Frankfurter Umgebung und RÖSLER (1983) berichtet von einer „Goldunke“, einer 1,5 cm großen Gelbbauchunke ohne jegliche Pigmentierung. Ähnliches wurde auch von der Rotbauchunke (*Bombina bombina*) durch OBERT & EICHELBERG (1976) bekannt. Ihnen fiel in Österreich eine „gescheckte“ Unke mit gelblichweißer Flanke bei ansonsten normaler Färbung auf. Bei allen beschriebenen Unken handelt es sich um Albinos oder teilalbinistische Tiere.

Wir stießen im Mai 1986 in einem Steinbruch in der Nähe von Aachen auf eine Gelbbauchunke (*Bombina variegata*) mit einer etwas anders gearteten Farbabweichung. Bei diesem Tier handelt es sich um ein ausgewachsenes Weibchen mit einem im Durchmesser wenige Millimeter messenden, scharf begrenzten gelben Fleck auf dem Rücken. Sonst stimmt die Färbung mit der für diese Population typischen Ausprägung überein. Die Unke wurde fotografiert und am Fundort wieder freigelassen (Abb. 1).



Abb. 1. Ein gelber Fleck auf dem Rücken zeichnet diese Gelbbauchunke aus.
– Aufn. M. ROGNER.

Yellow spot on the back of a Yellow-bellied Toad.

Noch im gleichen Monat fanden wir nur wenige hundert Meter vom Fundort des ersten Tieres entfernt eine andere Gelbbauchunke mit ähnlicher Farbanomalie. Es war wieder ein Weibchen, das wir an einem Waldrand in einer wassergefüllten Wagenspur entdeckten, und es wies ebenfalls einen gelben Fleck auf. Im Gegensatz zum Rückenleck des ersten Tieres war dieses Gelb jedoch etwas blasser und unschärfer gegen die braune Farbe der Dorsalseite abgesetzt und befand sich in der linken Schulterregion.

Es wird sich herausstellen, ob es sich bei diesen Funden um Zufälle handelt, oder ob eine Häufung solcher Abweichungen in diesem Gebiet vorliegt.

Für Hinweise auf ähnliche Erscheinungen innerhalb der Gattung *Bombina* wären wir sehr dankbar.

Two Yellow-bellied Toads found near Aachen with different yellow markings on their dorsal sides are described.

Key words: Dorsal yellow markings; Yellow-bellied Toad.

Schriften

- MERTENS, R. (1975): Eine teilweise albinistische Gelbbauchunke, *Bombina v. variegata*. – Salamandra, Frankfurt/M., 11 (2): 107-108.
- OBERT, H.J. & H. EICHELBERG (1976): Mitteilung über das Auftreten einer gescheckten Rotbauchunke, *Bombina bombina*. – Salamandra, Frankfurt/M., 12 (2): 105-106.
- RÖSLER, H.-J. (1983): Ein besonderer Glücks-„Fall“ – die „Goldunke“. – Aqu. – Mag., Stuttgart, 17: 428-429.

Eingangsdatum: 19. Juni 1986

Verfasser: ANDREAS PRACHT, Koperstraat 25, NL-6291 AH Vaals, Niederlande; MANFRED ROGNER, Apfelhofstraße 50, D-5190 Stolberg.