

**Fund einer ungewöhnlich großen Wechselkröte,
Bufo viridis LAURENTI, 1768 (Salientia: Bufonidae) in der Tschechoslowakei**

Im Sommer 1975 weilte ich für kurze Zeit im Gebirgshotel Malino bei Ružomberok, im Malá Fatra-Gebirge/NW-Slowakei. Das Hotel liegt 980 m ü. M. Am 6. August gegen 21 Uhr fand ich ein sehr auffälliges Exemplar der Wechselkröte. Es handelte sich um ein Männchen mit einer Körperlänge von 100 mm. Soweit mir bekannt ist, wurde noch nie ein größeres Tier dieser Art gefunden. WALTER, (1888) erwähnt ein Exemplar von 93 mm Kopf-Rumpflänge, OPATRŇY (1974) ein Männchen von 82 mm K-Rl, und HEMMER et al. (1978) erwähnen 2 Weibchen von 90 und 97 mm K-Rl als größte Exemplare. Die Messungen führte ich nach den gewöhnlichen Methoden am lebendigen Tier durch. Die Kopf-Rumpf- und die Femurlänge wurden vom oberen Rand der Kloakalöffnung aus gemessen. Die recht ungewöhnlichen Maße sind im einzelnen:

Kopf-Rumpflänge	100 mm	Trommelfell-Ø	4 mm
Kopflänge	18,5 mm	Femurlänge	32 mm
Kopfbreite	28 mm	Tibiallänge	34 mm
Abstand zw. Augenlidern	4,5 mm	Callus internus	6 mm
Augen-Ø	7,5 mm	Innerer Finger	6,5 mm.

Bemerkenswert ist auch, daß einige hundert Meter vom Fundort dieser Kröte entfernt (ein beleuchteter Betongehweg, der unweit des Hotels einen grasigen Abhang durchquert), gerade umgewandelte kleine Wechselkröten eine kleine Lache verließen. Diese Lache, eine verbreiterte Wagenspur, liegt noch einige Meter höher als der Fundort des großen Tieres. Dies zeigt, daß der Fund des Männchens kein Zufall war, die Wechselkröte sich vielmehr ganz normal in dieser Seehöhe fortpflanzt. Dies ist für die Tschechoslowakei eine Ausnahme. Nur LÁC (1963) schreibt, daß die Wechselkröte in der Slowakei nicht höher als 1000 m ü. M. vorkommt. Konkret führt dieser Autor (1968) die 910 m ü. M. liegende Lokalität Muráň an.

Report on an unusual big male of the green toad, *Bufo viridis*, which was found in Czechoslovakia. It's dimensions are documented by table. The find is noteworthy also by the height of the locality (980 m above sea level) and by the fact that the species reproduces also at this altitude.

Schriften

- HEMMER, H., J. F. SCHMIDTLER & W. BÖHME (1978): Zur Systematik zentralasiatischer Grünkröten (*Bufo viridis*-Komplex) (Amphibia, Salientia, Bufonidae). — Zool. Abh. Staatl. Mus. Tierkde. Dresden, 34 (24) : 350—384.

- LÁČ, J. (1963): Obojživelníky Slovenska. — Biol. práce SAV 9, 2 : 1—72.
— (1968): Amphibia: In: Stavovce Slovenska I. — Bratislava, 396 S.
OPATRŇY, E. (1974): Contribution to biometry of the green toad, *Bufo viridis* LAURENTI, 1768 (Amphibia: Bufonidae). — Věst. čs. spol. zool. Praha, 38 (4) : 271—278.
WALTER, A. (1888): Die Amphibien Transkaspiciens. — Zool. Jb., Jena, 3 : 973—996.