

Ein albinotischer Seefrosch *Rana ridibunda* PALLAS, 1771
aus Šibenik, Jugoslawien
(Anura: Ranidae)

Mit 1 Abbildung

Angeregt durch die Zusammenstellung albinotischer Raniden aus Europa in KLEMZ & KÜHNEL (1986) möchte ich auf ein leukistisches Exemplar des Seefrosches hinweisen, das ich am 25. Mai 1986 an den Krka-Wasserfällen bei Šibenik fangen konnte. Offensichtlich handelt es sich hierbei um den Erstnachweis von unvollständigem Albinismus bei *Rana ridibunda*.

Das Tier wies mit Ausnahme der Augen eine gleichmäßig gelbe Färbung auf, die auf der Bauchseite ins Weiße überging. An den Hinterbeinen konnte man bei genauerem Betrachten noch schwache Ansätze einer Zeichnung erkennen. Die Augen waren normal pigmentiert. Bei dem Exemplar handelte es sich um ein adultes Tier normaler Größe in einem ausgesprochen guten Ernährungszustand (Abb. 1).



Abb. 1. *Rana ridibunda*, Albino-Exemplar von den Krka-Wasserfällen bei Šibenik.
Rana ridibunda, albinistic specimen from the Krka-waterfalls near Šibenik.

Bemerkenswerterweise fand ich das Tier an einer seichten Wasserstelle vor einer kleinen Grotte, die den ganzen Tag über im Schatten liegt. In der näheren Umgebung des Fundortes konnte ich keine weiteren Seefrösche oder anderen Amphibien beobachten.

A partially albinistic Lake Frog is described from Šibenik (Yugoslavia), apparently the first record for *Rana ridibunda*.

Key words: Anura; Ranidae; *Rana ridibunda*; albino.

Schrift

KLEMZ, C. & K.-D. KÜHNEL (1986): Ein Beitrag zum Albinismus beim Moorfrosch *Rana arvalis* NILSSON, 1842. — Salamandra, Bonn, 22 (2/3): 190-195.

Eingangsdatum: 9. April 1987

Verfasser: MARTIN GABRIEL, Fritz-Haber-Straße 3, D-8403 Neutraubling.